

## Psiquiatría

## Psychiatry

### PS-1

#### PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO DE LOS PACIENTES EN QUIENES SE DETECTA CONSUMO DE COCAÍNA EN LA ATENCIÓN EN UN SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN

**AGUIRRE HERNÁN DARÍO, CARDONA TOBÓN CAROLINA, ARIAS GONZÁLEZ CAMILA, BUILES ARBELÁEZ NICOLE, PEÑA CAMILO, VALENCIA LORENA, BERROUET MEJÍA MARIE CLAIRE.**

*Hospital General de Medellín. Medellín, Colombia.*

**Introducción.** La cocaína es una de las drogas ilegales más usadas en el mundo, situación similar ocurre en Colombia siendo la cocaína y sus derivados la segunda droga ilegal de mayor consumo, siendo solo superada por el cannabis; se han reportado diferentes complicaciones asociadas a este consumo, compromete diferentes órganos y sistemas, dentro de las complicaciones más frecuentes se encuentran: infarto agudo al miocardio, enfermedad cerebrovascular convulsiones y psicosis.

**Métodos.** Estudio descriptivo de cohorte retrospectiva, cuyo objetivo es describir el perfil sociodemográfico y clínico de los pacientes en quienes se detectó consumo de cocaína en la atención en el servicio de urgencias de el Hospital General de Medellín entre 2014 y 2018.

**Resultados.** Se evaluaron 214 pacientes un 73.4% eran hombres, la edad promedio fue 31 años. La edad promedio de inicio del consumo fue de 18 años con un mínimo 8 y máximo de 55, un 71.2% eran solteros, el 60% no había terminado primaria y un 17.9% eran analfabetas, sólo el 5% de la población tenía estudios de educación superior. Con respecto a la frecuencia de consumo 62.3% referían un consumo del alcaloide diario, 11.4% Interdiario, 13.2% semanal y 6.6% mensual o quincenal

El alcohol es la coingesta más frecuente 61.3% de la población, otras sustancias de menor frecuencia fueron las feniletilaminas 19%, inhalantes 16.5%, opioides 8%.

Dentro de las complicaciones se encontraron: psiquiátricas en el 26.2% de los casos, cardiovasculares 11.7%, neurológicas en el 11.7%, hepáticas en el 4.7%, gastrointestinales en el 2.8%, renales en el 8.4%, 1.4% requirió diálisis.

**Conclusión.** Se aprecia consumo de cocaína en jóvenes de bajo nivel escolar, además conlleva a múltiples complicaciones médicas, principalmente psiquiátricas, y un aumento del consumo de recursos de salud.